

FICHA TÉCNICA

ZEPY0015BB

Ao Midori *Zeuzera pyrina* feromona
Difusor de vapores



Rev. 21.01 Fecha : 12/02/2021

Pág. 1 de 1

Descripción	Feromona sexual para monitoreo y captura masiva de <i>Zeuzera pyrina</i>
Fabricante	AO MIDORI BIOCONTROL S.L. C/Garbí, 33 – Pol. Ind. Can Pujades 08791 Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona) ESPAÑA
Núm. de comunicación	Real Decreto 951/2014: en trámite
Referencia interna	ZEPY0015BB
Tipo de formulación	VP – Difusor de vapores
Difusor	Septum de bromobutilo (gris)
Duración en campo	4-6 semanas en función de las condiciones ambientales
Periodo de seguridad	No aplica
Packaging	ZEPY0015BB01 Sobre de aluminio laminado, 1 ud. por sobre ZEPY0015BB25 Sobre de aluminio laminado, 25 uds. por sobre Otras presentaciones disponibles (sobre customizado, uds. por sobre...)
Almacenamiento y conservación	Mantener el producto en la nevera por debajo de 10°C en su envase original. Si es posible, se recomienda conservarlo en el congelador por debajo de -4°C, donde se mantendrá vigente durante 24 meses.
Consejos de uso y seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - Manténgase fuera del alcance de los niños. - Antes de abrir los sobres, llevar a temperatura ambiente. - Utilizar guantes desechables durante toda la manipulación.
Eliminación de los residuos generados	Respetar la normativa local y nacional. Los difusores usados o caducados y sus envases deberán entregarse a un gestor autorizado de residuos.

USOS Y APLICACIONES

Monitoreo (presencia y seguimiento de vuelo) y captura masiva del **taladro de la madera** *Zeuzera pyrina*. Es un barrenador de frutales y afecta a los frutales de pepita como el manzano y el peral, así como a frutales de hueso.

TRAMPAS RECOMENDADAS PARA SU USO

Trampa **Delta** o trampa de tipo **Funnel** (polillero).

DENSIDAD DE TRAMPAS

Para monitoreo, utilizar **2-3 trampas/ha**. Colocar al menos una trampa en el centro de la parcela y otra cerca del límite para conocer si la plaga está emigrando desde otro punto o ha pasado el invierno en el cultivo. Para captura masiva, utilizar **10-20 trampas/ha**.